

INTIMKIRURGI KOMPLIKASJONER

Blødning

Mindre blødninger fra operasjonsområdet kan forekomme første døgnet etter operasjonen og krever ingen behandling. Større blødninger og lokal ansamling av blod i vevet forekommer sjelden, men kan da kreve en mindre reoperasjon.

Infeksjon

Infeksjon etter intimkirurgi forekommer sjelden. Rutinemessig gis én dose med antibiotika like før inngrepet for å motvirke senere infeksjoner. Soppinfeksjon kan forekomme i sjeldne tilfeller og lar seg behandle med soppdrepende medikamenter.

Smerter

Operasjonsområdet vil være ømt og man kan oppleve lette smerter og lokal sårhet. Smertene forsvinner vanligvis i løpet av få dager, men kan hos enkelte pasienter vedvare noe lengre. Smertestillende medisiner vil bli utlevert på klinikken på operasjonsdagen før du reiser hjem.

Hevelse

Operasjonsområdet vil være hovent etterpå. Vanligvis forsvinner hevelsen i all vesentlighet i løpet av få uker.

Blåmerker

Det er ikke uvanlig at det kan oppstå blåmerker i operasjonsområdet. Dette skyldes små blødninger i vevet. Blåmerkene forsvinner spontant i løpet av 1-2 uker.

Arr

Arrene ved reduksjon av de store og små kjønnslepper tilheler som regel pent og er, for andre enn pasienten selv, stort sett ikke synlige eller følbare. De kan føles klumpete og harde den første tiden, men blir mykere av seg selv i løpet av 1-2 måneder.

Forstyrrelser i hudfølelsen

Kjønnsleppenes nervebaner forløper dypt i bløtvevene og vil således ikke påvirkes av inngrepet som foregår overflatisk.