

# ØYELOKKSPLASTIKK - ØVRE KOMPLIKASJONER

## **Blødning**

Blødning etter en øyelokksplastikk forekommer svært sjelden og oppstår da vanligvis i løpet av de første timene etter operasjonen. Øyelokket vil hovne opp og blod kan bre seg til øyehulen. Tilstanden krever rask behandling da det kan medføre skade på synsnerven om man ikke reagerer umiddelbart.

## **Infeksjon**

Infeksjon etter en øyelokksplastikk er sjelden, men kan forekomme. Skulle det allikevel inntreffe utvikler symptomene seg somregel i løpet av den første uken. Infeksjonen viser seg vanligvis ved økende smerter, hevelse og rødme på operasjonsområdet. Man kan også utvikle feber og nedsatt allmenntilstand. Tilstanden behandles med antibiotika.

## **Smerter**

Operasjonsområdet vil være ømt og man kan oppleve lette smerter og lokal sårhet. Smertene forsvinner vanligvis i løpet av få dager, men hos enkelte pasienter kan disse vedvare noe lengre. Smertestillende medisiner vil bli utlevert på klinikken på operasjonsdagen før du reiser hjem.

## **Hevelse**

Operasjonsområdet vil være hovent etter inngrepet. Vanligvis forsvinner hevelsen i all vesentlighet i løpet av få uker, men hos enkelte kan det ta måneder før huden blir normal igjen.

## **Blåmerker**

Det er ikke uvanlig at det kan oppstå blåmerker på operasjonsområdet. Det skyldes små blødninger i vevet. Blåmerkene forsvinner spontant i løpet av få uker.

## **Arr**

Arrene plasseres slik at de ikke er synlige når øynene er åpne. I begynnelsen vil de være røde og hovne, men over måneder blir de vanligvis gradvis lysere og mykere. Enkelte danner dessverre arr som kan bli mindre pene.

Selv om man har gjennomført en øyelokksplastikk kan hudoverskuddet over tid utvikle seg og kreve ny behandling.